

Kirsten Holst

SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK
FREDERIKSVÆRKSGADE 1, 3400 HILLERØD
KONSULTATION EFTER AFTALE DAGLIGT KL. 9-12 PÅ TLF. 4826 8081 FAX 4826 8068
kirsten@gynholsthillerod.dk

Gardasilvaccination

Gardasil vaccinen er udviklet til at forebygge livmoderhalskræft, forstadier til kræft i livmoderhalsen og de ydre kønsdele samt til at forebygge kønsvorter. Der er ikke tale om en behandling.

Der er fundet et virus som fremkalder ovennævnte tilstande. Viruset kaldes human papillomavirus (HPV), og består af mange undertyper.

Virus af undertypen 16 og 18 er ansvarlige for ca. 70 % af tilfælde med livmoderhalskræft.

Virustype 6 og 11 er ansvarlig for ca. 90 % af alle kønsvorter.

Denne vaccine beskytter imod type 6, 11, 16 og 18.

Der skal vaccineres 3 gange på et halvt år. Vaccinationen gives på ydersiden af overarmen. 2. dosis gives 2 mdr. efter 1. dosis og 3. dosis gives 6 mdr. efter 1. dosis. Det er meget almindeligt at opleve lidt feber og evt. rødme, hævelse og ømhed på vaccinationsstedet.

Du får udleveret et vaccinationskort med nr. på den vaccine, der er givet, og dette kort skal du opbevare og medbringe ved vaccinationerne og senere opbevare det på et sikkert sted sammen med dine andre vaccinationskort.

Aktuelt koster selve vaccinen ca. 1150 kr. pr gang. Sygesikringen Danmark giver 50% i tilskud, også til vaccinationsgebyret (100 kr).

Effekten af vaccinen er over 98 %. Hvis du allerede har haft en af undertyperne af HPV yder vaccinen også beskyttelse mod denne type efter de sidste forskningsresultater.

Varigheden af beskyttelsen kendes på nuværende tidspunkt ikke, fordi vaccinen er helt ny, men indtil videre er der observeret en beskyttende effekt i 9,5 år.

Hvem bør ikke vaccineres?

I tilfælde af akut sygdom ledsaget af feber bør vaccinationen udskydes.

- Personer der har haft alvorlige bivirkninger ved tidligere vaccination med vaccinen.
- Personer med allergi overfor et eller flere af indholdsstofferne.

Graviditet

Undlad eller stop vaccinationen.

Kan anvendes under amning.

Bivirkninger

Rødme, hævelse og ømhed på injektionsstedet, hovedpine, utilpashed og feber.

For yderligere detaljer henvises til produktresuméet under relaterede links.

Opbevaring:

Opbevares i køleskab.

Kirsten Holst

Opdateret jan.2012