

Kirsten Holst

SPECIALLÆGE I GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK
FREDERIKSVÆRKSGADE 1, 3400 HILLERØD
KONSULTATION EFTER AFTALE DAGLIGT KL. 9-12 PÅ TLF. 4826 8081 FAX 4826 8068
kirsten@gynholsthillerød.dk

Keglesnitsoperation

Keglesnitsoperationen er et lille og hurtigt overstået indgreb. Det udføres ved, at man med en tynd elektrisk slynge fjerner et kegleformet stykke væv fra livmoderens hals. Det vil i reglen medføre ingen eller kun en let smertefornemmelse. Du behøver ikke at være fastende.

Det er vigtigt, at du oplyser om allergi og dit medicinforbrug før indgrebet.

Du må gerne tage 1-2 tablet Panodil a 500 mg ca. 1 time før indgrebet.

NB: Ikke Kodimagnyl

Før indgrebet bliver livmoderhalsen lokalbedøvet. Der gives endvidere en beroligende indsprøjtning med Stesolid. Der oplægges en lang gazetampon, som skal fjernes 24 timer efter indgrebet. Vi har et hvilerum, hvor du kan ligge bagefter og så tage hjem efter ca. 15 min.

Du må **ikke føre bil / færdes alene i trafikken** eller være alene i hjemmet de næste 3 - 5 timer, fordi du har fået Stesolid. På grund af medicinen har du muligvis glemt, hvad der er sket og sagt under undersøgelsen. Du opfordres derfor til at læse denne side grundigt.

Den første uges tid bør du være sygemeldt og tage det med ro, dvs. undgå tunge løft, rengøring, sport, samleje, karbad, svømning, brug af tamponer. Der kan være blodigt udflåd op til et par uger, men der må ikke være frisk blødning som ved en menstruation. Efter 1 uge falder sårskorpen af, og der kan da være lidt frisk blødning, hvilket ikke skal bekymre dig. Du er altid velkommen til at ringe og stille spørgsmål.

Det fjernede slimhindevæv bliver sendt til mikroskopisk undersøgelse, og vi tilbyder en konsultation til svar på prøverne.

Ved kraftig blødning, smerter eller feber bør du søge læge.

Kirsten Holst

Opdateret jan. 2012

WWW.GYNHOLSTHILLEROED.DK